

Ecocid S Proszek do dezynfekcji dla zwierząt 2,5 kg



Cena: 203,51 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja	Akcesoria dla zwierząt
Marka Producent	KRKA
Opakowanie	2,5 kg
Postać	proszek
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Środek dezynfekujący o udowodnionym działaniu przeciwko wielu patogenom, w tym wirusowi afrykańskiego pomoru świń i SARS-CoV-2. Ma postać rozpuszczalnego w wodzie proszku, co ułatwia stosowanie i przechowywanie. Preparat biobójczy do stosowania w medycynie weterynaryjnej, do dezynfekcji systemów wody pitnej przeznaczonych dla zwierząt, do stosowania w przemyśle spożywczym i paszowym. **Wskazania** Ecocid S jest preparatem dezynfekcyjnym wykazującym aktywność przeciwko wirusom. Posiada również właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze w stosunku do *Candida albicans*. Dzięki szerokiemu spektrum działania biobójczego preparat może być używany w - medycynie weterynaryjnej (gabinety, kliniki, laboratoria weterynaryjne) do dezynfekcji powierzchni, wyposażenia, pojemników, naczyń szklanych, instrumentów itp., - hodowli zwierząt - do dezynfekcji wszelkich powierzchni i wyposażenia używanego do przygotowywania karmy, jak również w stajniach, oborach, schroniskach dla psów, wszelkich klatkach dla zwierząt, ulach, lub w innych pomieszczeniach gdzie trzymane są zwierzęta, - inne miejsca zastosowania - do dezynfekcji środków transportu dla zwierząt, powierzchni i sprzętu na targach zwierząt, rzeźni, miejsc obróbki i przechowywania żywności oraz do dezynfekcji sprzętu i powierzchni w gospodarstwie domowym. - jako roztwór aktywny jest stosowany w postaci aerozolu, rozpylania, zamgławiania lub kąpieli np. kopyt, a także do stosowania na wszelkich barierach dezynfekcyjnych – np. maty. **Sposób użycia** Do ogólnej dezynfekcji uprzednio oczyszczonej powierzchni i wyposażenia należy przygotować 1 % roztwór Ecocid S. W tym celu należy rozpuścić zawartość 50 g opakowania w 5 litrach wody. Polecane jest użycie letniej wody w celu szybszego rozmieszania preparatu. Gdy potrzebna jest większa objętość roztworu polecamy użyć opakowania 1 kg, które należy rozpuścić w 100l wody - Dezynfekcja zasadnicza 1 : 100 (1%) Przygotowany roztwór rozpylić na uprzednio oczyszczonej, przeznaczoną do dezynfekcji powierzchnię za pomocą niskociśnieniowych lub innych mechanicznych spryskiwaczy w dawce 300 ml/m². Po 30 do 60 minut lub po wyschnięciu powierzchni wprowadzić zwierzęta - Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń na fermach, w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt lub do przygotowania karmy 1 : 200 – 1 : 33 (0,5% do 3%) zależnie od stopnia zabrudzenia. Powierzchnię urządzeń czyścić i dezynfekować nanosząc roztwór roboczy poprzez rozpylenie go niskociśnieniowym lub innym mechanicznym spryskiwaczem w dawce 300ml/m². Po 15-60 minutach, zależnie od poziomu zabrudzenia spłukać czystą wodą. - Czyszczenie systemu wody pitnej Dezynfekcja i czyszczenie zasadnicze 1 : 200 (0,5%) Należy napełnić zbiornik wodą i dodać roztwór roboczy preparatu. Po 60 minutach cały system dokładnie przepłukać czystą wodą. - Kontynuacja czyszczenia systemu wody pitnej 1 : 1000 (0,1%) Wymieszać właściwą ilość preparatu Ecocid S z wodą znajdującą się w zbiorniku lub przygotować roztwór roboczy i przepuścić przez cały system używając urządzenia automatycznie dozującego. - Dezynfekcja przez maty dezynfekcyjne dla samochodów lub do butów, oraz przez kąpiele kopyt 1 : 100 (1%) Stosować nasączone maty dezynfekcyjne lub płyn w wannach do dezynfekcji kopyt przez 4 dni lub do czasu zbytniego zabrudzenia roztworu. - Dezynfekcja metodą rozpylania Rozpylenie preparatu w celu zredukowania przenoszenia się infekcji w okresie wybuchu

choroby (szczególnie układu oddechowego) 1 : 200 (0,5%) Dezynfekować poprzez rozpylanie za pomocą spryskiwaczy ciśnieniowych lub innych spryskiwaczy przenośnych w dawce 1 l/ 10m² powierzchni podłogi. - Zamgławianie na zimno 1 : 100 (1%) Zamgławiać puste pomieszczenia za pomocą zamgławiacza w dawce 1 l/10m² powierzchni podłogi i pozostawić by mgła działała przez 30 min. Przed wprowadzeniem zwierząt należy przeprowadzić wentylację pomieszczeń przez 30 do 60 minut. - Zamgławianie na gorąco 1 : 25 (4%) Najpierw zmieszać 15 części nośnika – „zawieszacza mgły” z 85 częściami wody. Następnie do powstałego roztworu dodać preparat Ecocid S. Tak powstałym roztworem roboczym zamgławiać używając specjalnego zamgławiacza, w dawce 1 l/40m² powierzchni podłogi i pozostawić by mgła działała przez 30 do 60 min. Przed wprowadzeniem zwierząt należy przeprowadzić wentylację pomieszczeń przez 30 do 60 minut. Należy używać ochronnej odzieży, obuwia, okularów, masek i rękawic. Sprzęt wykorzystywany do dezynfekcji należy wypłukać dużą ilością wody.