

Alugastrin 3 Forte 20 saszetek



Cena: 68,04 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja	Wyrób medyczny leczniczy
Marka Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Opakowanie	20 saszetek
Postać	proszek
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Alugastrin 3 Forte to wyrób medyczny, który wykazuje unikalne, potrójne działanie w leczeniu nawracającej zgagi: - **Ochrona żołądka i przełyku** - naturalny kompleks Mucosave tworzy ochronną warstwę powlekającą błonę śluzową żołądka i przełyku. - **Hamowanie refluksu** - w kontakcie z kwasem żołądkowym alginian staje się żelem, który zapobiega cofaniu się kwaśnej treści i hamuje refluks w kierunku przełyku - **Redukcja nadkwaśności** - węglan wapnia powoduje zmniejszenie kwasowości soku żołądkowego. **Alugastrin 3 Forte** w postaci proszku do rozpuszczenia ma przyjemny waniliowy smak. **Działanie** Efekt zapobiega cofaniu się kwaśnej treści żołądka do przełyku poprzez mechanizm fizycznego działania. **Skład** Mucosave, (ekstrakt z liści opuncji figowej i liści oliwki europejskiej), alginian sodu, węglan wapnia, maltodekstryna, fruktoza, sukraloza, krzemionka, aromaty. **Sposób użycia** - Wsypać zawartość saszetki do szklanki i napełnić do połowy wodą (niegazowaną), - energicznie mieszać do uzyskania jednorodnej zawiesiny, a następnie wypić. - Zaleca się przyjmowanie jednej saszetki wieczorem przed snem. - Druga saszetka może być przyjęta w ciągu dnia, po posiłku, w przypadku takiej konieczności. - Maksymalne zalecane leczenie to 30 dni. **Przeciwwskazania** Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na którykolwiek ze składników. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na którykolwiek ze składników. Obecność sodu w składzie wymaga ostrożności podczas stosowania u pacjentów z nadciśnieniem, niewydolnością serca lub nerek. Biorąc pod uwagę brak odpowiednich badań i danych dotyczących stosowania u kobiet w ciąży i u dzieci w wieku poniżej 12 lat, należy zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem. Nie używać po upływie terminu ważności. Nie używać produktu jeśli opakowanie jest uszkodzone lub naruszone. Nie należy przekraczać zalecanego dawkowania. Należy korzystać z produktu zgodnie z instrukcją użytkowania.