

Nutridrink Multi Fibre o smaku waniliowym 4x125 ml



Cena: 50,45 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja	Diet.środ.spoż.sPECIAL.przezn.med.
Marka Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Opakowanie	4 sztuki po 125 ml
Postać	płyn
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Nutridrink Multi Fibre, smak waniliowy, płyn – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona do postępowania dietetycznego w niedożywieniu i ryzyku niedożywienia związanym z chorobą. Zalecany szczególnie pacjentom ze zwiększonym zapotrzebowaniem na błonnik. Produkt wysokoenergetyczny, kompletny pod względem odżywczym. Produkt bezglutenowy. **Skład** białka mleka krowiego, syrop glukozowy, woda, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), trehaloza*, oligofruktoza, galaktooligosacharydy (z mleka krowiego), cytrynian potasu, emulgator (lecytyny (lecytyna sojowa)), pektyna, aromaty, wodorofosforan magnezu, fruktooligosacharydy, chlorek choline, chlorek potasu, cytrynian sodu, L-askorbinian sodu, mleczan żelaza (II), siarczan cynku, barwnik (kurkumina), glukonian miedzi (II), siarczan manganu, nikotynamid, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenu wapnia, cholekalciferol, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, octan retinylu, fluorek sodu, chlorek chromu (III), kwas pteroilmonoglutaminowy, molibdenian (VI) sodu, jodek potasu, selenian (IV) sodu, D-biotyna, fitomendalion, cyjanokobalamina. **Przeznaczenie** Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą. **Sposób użycia** 1-3 butelki na dobę jako uzupełnienie diety, 5-7 butelek na dobę jako jedyne źródło pożywienia. Stosować pod nadzorem lekarza. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Najlepiej podawać schłodzony. Pić powoli. Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia. **Przeciwwskazania i środki ostrożności** Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Stosować ostrożnie u dzieci w wieku 3-6 lat. Nie stosować w przypadku alergii na białka mleka krowiego, galaktozemu i fruktozemu oraz u pacjentów wymagających diety bezresztkowej. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Należy monitorować podaż płynów, aby zapewnić odpowiedni stan nawodnienia pacjentów. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w zamkniętej butelce, w lodówce, maksymalnie do 24 godzin. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Produkt poddany obróbce UHT. Stosować pod nadzorem lekarza.