

Nutridrink o smaku truskawkowym 4x125 ml



Cena: 45,17 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja	Diet.środ.spoż.sPECIAL.przezn.med.
Marka Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Opakowanie	4 sztuki po 125 ml
Postać	płyn
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Nutridrink, płyn o smaku truskawkowym, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. To wysokoenergetyczny, odżywczy płyn zawierający białko, węglowodany, tłuszcze w odpowiednich proporcjach. Wzbogacony kompletem witamin i minerałów niezbędnych osobie chorej. Nie zawiera błonnika i glutenu. **Skład** Białka mleka krowiego, syrop glukozowy, woda, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), mleczan potasu, cytrynian potasu, emulgator (lecycyny (lecycyna sojowa)), wodorofosforan magnezu, aromat, chlorek choliny, barwnik (karmin), cytrynian sodu, L-askorbinian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, mleczan żelaza(II), siarczan cynku, glukonian miedzi(II), siarczan manganu, nikotynamid, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenu wapnia, cholekalcyferol, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, octan retinylu, fluorek sodu, chlorek chromu(III), kwas pteroilomonoglutaminowy, molibdenian(VI) sodu, jodek potasu, selenian(IV) sodu, D-biotyna, fitomenadion, cyjanokobalamina.

Właściwości Jest odpowiedni do stosowania jako uzupełnienie diety pacjenta lub jako jedyne źródło pożywienia. **Przeznaczenie** Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu i ryzyku niedożywienia związanym z chorobą. Szczególnie polecany do wprowadzenia, w przypadku: - braku apetytu i niechęci do jedzenia, - problemów z jedzeniem (gryzieniem, żuciem, połykaniem), - pogorszonego trawienia i wchłaniania objawiającego się dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego jak nudności, wymioty, biegunka i/lub zaparcia, - zwiększonego zapotrzebowania na składniki odżywcze będące następstwem choroby. **Zalecane dzienne spożycie** Jako uzupełnienie diety: 1-3 butelki na dobę (300-900 kcal). Jako jedyne źródło pożywienia: 5-7 butelek na dobę (1500-2100 kcal). **Sposób użycia** Dobrze wstrząsnąć przez użyciem. Zaleca się pić powoli - 1 opakowanie od 30 minut do 1 godziny, lub między posiłkami. Najlepiej podawać schłodzony.