

## ZIAJA Etodal żel 100 mg/g 100 g



Cena: 42,90 pln

## Opis słownikowy

Klasyfikacja	Lek
Marka Producent	ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z O.O.
Opakowanie	100 g
Postać	żel
Wysyłka zamówienia	w 24 h

## Opis produktu

**ZIAJA Etodal żel 100 mg/g 100 g** Etodal to lek w postaci żelu, zawiera w składzie etofenamat, który działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Etodal stosuje się w przypadku kontuzji sportowych (np. stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia, bólach stawów, reumatyzmie). Żel wykazuje działanie łagodzące obrzęk towarzyszący urazowi. **Składniki** Substancją czynną leku jest etofenamat. 1 g żelu zawiera 100 mg etofenamatu. Substancje pomocnicze - glikol propylenowy, makrogol 400, makrogolu eter oleinocetylowy, sodu wodorotlenek, karbomer 980, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona. **Dawkowanie** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka - Żel nakłada się w postaci paska długości około 5 - 10 cm na bolące miejsce. Żel wciera się w bolące miejsce do momentu wchłonięcia. Czynność powtarza się 3 do 4 razy na dobę. Leczenie dolegliwości reumatycznych trwa zazwyczaj 3 do 4 tygodni, zaś tępych urazów (np. urazów sportowych) - do 2 tygodni. Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Nie stosować leku dłużej niż 2 tygodnie bez konsultacji z lekarzem. **Działanie** Etofenamat (substancja czynna żelu Etodal) należy do grupy leków nazywanej NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne). Etodal działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Zmniejsza również uwalnianie histaminy i stabilizuje błony komórkowe. Prowadzi do zahamowania procesów wysiękowych i zmniejszenia obrzęków. **Wskazania** Etodal stosuje się w przypadku: tępych urazów, takich jak - stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów; chorób zwyrodnieniowych, stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych; reumatyzmu pozastawowy (ból okolicy krzyżowo-łędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych: zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgniętych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony, zapalenie nadkłykci). **Stosowanie leku u dzieci i młodzieży** Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży.