

# Fypryst 2,5 mg Aerosol przeciw pchłom i kleszczom dla psów i kotów 100 ml



Cena: 40,17 pln

## Opis słownikowy

Klasyfikacja	Akcesoria
Marka Producent	KRKA
Opakowanie	100 ml
Postać	aerosol
Wysyłka zamówienia	w 24 h

## Opis produktu

**Charakterystyka** Fypryst Aerosol dla psów i kotów to skuteczny środek przeciwpasożytniczy, który zapewnia ochronę przed pchłami i kleszczami. Produkt zawiera substancję czynną - fipronil, który działa owadobójczo i roztoczobójczo, niszcząc pasożyty poprzez blokowanie transferu jonów chlorowych przez błony komórkowe, co prowadzi do niekontrolowanej aktywności ośrodkowego układu nerwowego i śmierci owadów lub roztoczy. Fipronil gromadzi się w tłuszczowej strukturze skóry i mieszkach włosowych, skąd jest sukcesywnie wydzielany na powierzchnię skóry i sierści, co zapewnia długotrwałe działanie produktu. **Wskazania** Leczenie i przeciwdziałanie infestacji pcheł i kleszczy u kotów i psów i jako element strategii leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS) u kotów i psów. Produkt jest aktywny przeciwko kleszczom Ixodes spp. szczególnie Ixodes ricinus będącym ważnym wektorem przenoszenia boreliozy. Produkt kontroluje infestację wszołłów Trichodectes canis u psów i wszołłów (Felicola subrostratus) u kotów. **Działanie** Produkt jest skuteczny przeciwko pchłom u psów przez 3 miesiące i do 2 miesięcy u kotów, w zależności od presji środowiska. Skuteczność przeciwko inwazji kleszczy przez okres do jednego miesiąca u psów i kotów, w zależności od poziomu presji środowiska. **Stosowanie** Przed zastosowaniem dokładnie przeczytaj ulotkę, dołączoną do opakowania. Spryskaj całą powierzchnię ciała z odległości około 10 – 20 cm. Pryskaj pod włos, upewnij się, że cała sierść jest wilgotna. Zmierz włosy, szczególnie u zwierząt długowłosych, tak by produkt dotarł do skóry. W celu pełnego zwilżenia sierści zastosuj 6-12 naciśnieć pompki butelki na każdy kilogram ciała zwierzęcia. Ilość zależy od długości włosa zwierzęcia- im dłuższy, tym więcej więcej preparatu należy użyć. Z powodu braku odpowiednich badań bezpieczeństwa, minimalny okres między kolejnym zastosowaniem produktu powinien wynosić 4 tygodnie. Dla optymalnej skuteczności nie zaleca się kąpać zwierząt 2 dni przed i po zastosowaniu produktu.