


## Raphacholin Forte HERBAPOL WROCLAW 30 tabletek



Cena: 51,89 pln

## Opis słownikowy

Klasyfikacja	Lek ziołowy
Marka Producent	WROCLAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletki
Wysyłka zamówienia	w 24 h

## Opis produktu

**Charakterystyka** Raphacholin Forte to lek w postaci tabletek powlekanych do stosowania w niedostatecznym wydzielaniu żółci przez wątrobę i niestrawności objawiającej się wzdęciami, bólami brzucha, odbijaniem, nudnościami, zaparciami oraz jako łagodny środek przeczyszczający. **Skład** Substancją czynną leku jest kwas dehydrocholowy (Acidum dehydrocholicum). 1 tabletkę powlekana zawiera 250 mg kwasu dehydrocholowego (Acidum dehydrocholicum). Substancje pomocnicze: Wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej (10-15:1) [wyciąg natywny (20-30:1) 50 %, maltodekstryna 50 %, ekstrahent – woda] Olejek eteryczny miętowy, celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetyloskrobi, skrobia ziemniaczana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, sodu laurylosiarczan, węgiel aktywny, powłoczka Aqua Polish black 081.06 o składzie: hypromeloza, laktoza jednowodna, talk, makrogol, tlenek żelaza czarny (E 172), indygotyna (E 132). **Dawkowanie** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. **Działanie** Raphacholin Forte zwiększa objętość wydzielanej żółci (żółciopędny) oraz przyspiesza jej transport do dwunastnicy. Zwiększona ilość żółci pobudza pracę jelita grubego, dzięki czemu produkt posiada łagodne działanie przeczyszczające. **Wskazania** Raphacholin forte tradycyjnie stosuje się w niestrawności, dolegliwościach trawiennych związanych z dysfunkcją wątroby (wzdęcia, bóle brzucha, odbijania, nudności, zaparcia), w niedostatecznym wydzielaniu żółci przez wątrobę. **Przeciwwskazania** Nie należy stosować leku nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Leku nie należy stosować w ostrych i przewlekłych schorzeniach wątroby, ostrych stanach zapalnych w obrębie przewodu pokarmowego, niedrożności dróg żółciowych i przewodu pokarmowego.