


Raphacholin C HERBAPOL WROCLAW 30 tabletek



Cena: 24,62 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja	Lek ziołowy
Marka Producent	WROCLAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletki
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Skład Substancja czynna: 1 drażetka o masie 600 mg zawiera substancje czynne: Raphani sat. nigri extr. sicc. cum Carbo medicinalis (1:1) 150,0 mg, Cynarae herbae extr. spissum 47,0 mg, Menthae pip. oleum 15,0 mg. Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, sacharoza, żelatyna, aerosil, stearynian magnezu, talk, guma arabska, wodorofosforan wapnia, węgiel leczniczy. **Wskazania** Lek stosuje się w atonii pęcherzyka żółciowego, w zaburzeniach trawienia (zwłaszcza spowodowanych dyskinezą dróg żółciowych, wzdęciach, zaparciach), pomocniczo w stanach zapalnych dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego. W przypadku kamicy żółciowej lek stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem. **Działanie** Raphacholin C jest lekiem działającym żółciopędnie i żółciotwórczo (wywierającym bezpośredni wpływ na wątrobę, pobudzającym wydzielanie żółci). Zawiera w swoim składzie suchy wyciąg z czarnej rzodkwi z węglem leczniczym, suchy wyciąg z karczochów, kwas dehydrocholowy i olejek miętowy. Regularne przyjmowanie preparatu pobudza wydzielania żółci co działa ochronnie na mięszk wątroby, przyspiesza eliminację z żółcią szkodliwych substancji i wzmacnia ruchy perystaltyczne jelit. Raphacholin C stosuje się w niestrawności i dolegliwościach trawiennych (nudności, bóle brzucha, odbijania, wzdęcia, zaparcia) powodowanych głównie przez zaburzenia kurczliwości dróg żółciowych. W porozumieniu z lekarzem preparat jest stosowany pomocniczo w przewlekłych stanach zapalnych dróg żółciowych. **Dawkowanie** Dorosłym 3 razy dziennie po 1 do 2 drażetek po jedzeniu. W zaparciach 2 drażetki rano i wieczorem na 1/2 godziny przed jedzeniem. W uzasadnionych przypadkach stosować u dzieci powyżej 12 roku życia 1 drażetkę w całości 3 razy dziennie po posiłku. **Przeciwwskazania** Nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku, ciężkich chorobach wątroby, niedrożności dróg żółciowych i przewodu pokarmowego, ostrych i przewlekłych stanach zapalnych żołądka i jelit. Nie badano bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią, dlatego nie zaleca się stosowania preparatu bez konsultacji z lekarzem. **Informacja** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.