

Fresubin Protein Powder 300 g



Cena: 119,43 pln

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Klasyfikacja | Diet.środ.spoż.sPECIAL.przezn.med. |
| Marka Producent | FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O. |
| Opakowanie | 300 g |
| Postać | proszek |
| Wysyłka zamówienia | w 24 h |

Opis produktu

Charakterystyka Fresubin Protein Powder, proszek – do postępowania dietetycznego u osób niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem związanym z chorobą, w szczególności: ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko wynikającym z choroby nowotworowej, sarkopenii, w okresie okołoperacyjnym oraz u dzieci z zaburzeniami przyrostu masy ciała. **Przeznaczenie** Zalecany pacjentom zagrożonym niedożywieniem i mającym wyższe zapotrzebowanie na białko, m.in. - osobom chorującym na nowotwory, - osobom starszym, - pacjentom w okresie rekonwalescencji, - w czasie rehabilitacji. **Sposób użycia** Podawanie powinno być ustalane przez personel medyczny w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta. Produkt przeznaczony jest do żywienia uzupełniającego: 2-3 razy na dobę po 10-15 g (20-45 g/dobę). Dodawanie do płynów lub posiłków o temperaturze > 70°C, ale niegotujących się: rozpuścić 2-3 miarki (10-15 g) w niewielkiej ilości płynu (25-50 ml) o temperaturze pokojowej. Przygotowaną mieszaninę dodać do 150 ml gorącego płynu lub 150 g posiłku bezpośrednio przed podaniem (maksymalnie 10 minut przed podaniem). Nie gotować podczas dodawania lub po dodaniu proszku. Fresubin® Protein Powder nie jest przeznaczony do gotowania. Dodawanie do płynów lub posiłków o temperaturze Produkt można dodawać do zimnych lub gorących, słodkich lub pikantnych płynnych posiłków (np.: soków owocowych, mleka, zup) oraz puree. **Przeciwwskazania i środki ostrożności** Należy stosować pod nadzorem lekarza. Nieodpowiedni jako jedyne źródło pożywienia. Podczas stosowania należy monitorować poziom potasu u pacjentów stosujących dietę niskopotasową. Nie podawać dzieciom poniżej 1 roku życia. Należy zachować ostrożność podczas podawania dzieciom poniżej 6 lat. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u chorych na galaktozemię. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego (dożylnego)! Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 2 miesięcy. Pakowany w atmosferze ochronnej.