

Fresubin YOcreme smak Biskopt 4x125 g



Cena: 52,84 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja	Diet.środ.spoż.sPECIAL.przezn.med.
Marka Producent	FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
Opakowanie	4x125 g
Postać	płyn doustny
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Fresubin Yocrema, jogurt o smaku biskoptowym – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego, kompletna pod względem wartości odżywczych. Wysokoenergetyczna (1,5 kcal/g), wysokobiałkowa (20% energii), o wysokiej zawartości wapnia i witaminy D, zagęszczona, przeznaczona do żywienia drogą doustną za pomocą łyżeczki. Zawiera laktozę. Produkt o niskiej zawartości błonnika, bezglutenowy. Odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia. Dzięki gęstej konsystencji i kwaskowemu smakowi preparat nadaje się dla osób mających trudności z połykaniem. Smak biskoptowy. **Skład** woda, sacharoza, białko serwatki, fermentowane odtłuszczone mleko w proszku, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), skrobia modyfikowana, regulator kwasowości (E 270), mleczan wapnia, substancja zagęszczająca (E 440), maltodekstryna, aromaty, emulgatory (E 471, lecytyny sojowe), dwuwinitian choline, witamina C, chlorek sodu, difosforan żelaza, siarczan cynku, tlenek magnezu, witamina E, kwas pantotenowy, chlorek manganu, niacyna, siarczan miedzi, witamina B6, tiamina, ryboflawina, witamina A, fluorek sodu, kwas foliowy, chlorek chromu (III), jodek potasu, selenin sodu, witamina K, biotyna, molibdenian sodu, witamina D, witamina B12.

Przeznaczenie Środek spożywczy przeznaczony jest do postępowania dietetycznego u osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, w szczególności z zaburzeniami połykania (dysfagia) lub zwiększonym zapotrzebowaniem na białko i energię. **Sposób użycia** Spożycie powinno być ustalone przez personel medyczny w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta. Produkt przeznaczony jest do żywienia uzupełniającego: 4 kubki (750 kcal)/dobę lub całkowitego: 8 kubków (1500 kcal)/dobę. Najlepiej podawać produkt schłodzony. **Przeciwwskazania i środki ostrożności** Należy stosować pod nadzorem lekarza. Nie podawać dzieciom poniżej 3 lat. Należy zachować ostrożność podczas podawania dzieciom poniżej 6 lat. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u chorych na galaktozemię. Podczas stosowania należy zapewnić odpowiednią podaż płynów. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu opakowanie można przechowywać w lodówce maksymalnie przez 24 godziny.