

Rutinoscorbin 210 tabletek powlekanych



Cena: 33,28 pln

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|--|
| Klasyfikacja | Lek |
| Marka Producent | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O. |
| Opakowanie | 210 tabletek |
| Postać | tabletki powlekane |
| Wysyłka zamówienia | w 24 h |

Opis produktu

Charakterystyka Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg to lek w postaci tabletek powlekanych, który łączy w sobie działanie rutozydu i witaminy C (kwasu askorbowego). Rutozyd zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych i wzmacnia je. Witamina C jest niezbędna w wielu procesach metabolicznych. Bierze udział w tworzeniu kolagenu, hemoglobiny, ułatwia przyswajanie żelaza, a także działa przeciwutleniająco. Zawarty w leku rutozyd chroni witaminę C przed utlenieniem. Dzięki temu dłużej zachowuje ona swoje właściwości.

Wskazania W stanach niedoboru i zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (przeziębienia, zakażenia wirusowe, w tym grypa) oraz pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń. **Skład** 1 tabletkę zawiera: substancje czynne: 25 mg rutozydu, 100 mg kwasu askorbowego, substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, alkohol poliwinylowy, talk, magnezu stearynian. W skład otoczki tabletki wchodzi: Opadry II 85F32876 Żółty (alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E171), talk, żółcień chinolinowa aluminium lak).

Działanie Przeciwutleniające, wzmacniające naczynia krwionośne oraz zmniejszające ich przepuszczalność. **Dawkowanie** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek stosuje się doustnie. Zalecana dawka to: -profilaktycznie: od 1 do 2 tabletek na dobę. w stanach niedoboru witaminy C: od 1 do 2 tabletek od 2 do 4 razy na dobę. dzieci poniżej 6 lat: lek Rutinoscorbin należy stosować według wskazań lekarza. -pacjenci z chorobami nerek: nie powinni przyjmować więcej niż 5 tabletek na dobę (co odpowiada 500 mg witaminy C). Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Po zastosowaniu bardzo dużych dawek może wystąpić biegunka, istnieje ryzyko hemolizy (rozpadu krwinek czerwonych), kamicy nerkowej, zaburzeń wodno-elektrolitowych oraz znacznego osłabienia działania kobalaminy (witaminy B12). Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. **Przeciwwskazania** Nie stosować leku Rutinoscorbin, jeśli pacjent ma: -uczulenie (nadwrażliwość) na rutozyd oraz kwas askorbowy (witaminę C) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; -kamicę szczawianową (chorobę polegającą na powstawaniu złogów, tak zwanych „kamieni” w nerkach) lub miał ją w przeszłości; -choroby związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna) lub inne choroby mogące powodować nadmiar żelaza w organizmie.